

# HAIKUI PAI BISUNING PENJI

## Spray na nieżyt nosa, alergię i zapalenie zatok

Skład:

Chlorofeniramina 0,016%

Extractum 5:1		
Rhizoma Nelumbo speciosum (lotos orzechodajny, kłącza)	ou jie	17,9%
Contipeda minima (zioło przeciw kichaniu)	e shi bu cao	15,7%
Fructus Xanthium strumarium, sibiricum (rzepień pospolity)	cang er zi	15,2%
Radix Astragalus membranaceus (traganek błoniasty, korzenie)	huang qi	13,7%
Folium Fikus Carica (figa karyjska, liście)	wu hua guo	12,8%
Cortex et Radix Paeonia suffruticosa (piwonia drzewiasta)	mud dan pi	11,7%
Oleum Pimpinella anisum (biedrzyk anyż, olej)	yang hui xiang	10%



**C.minima** to unikatowe antybakteryjne i przeciwwirusowe zioło medycyny chińskiej. Roślina mieści 23 aktywne substancje (laktony seskwiterpenowe i monoterpenowe tymol i inne) aktywne wobec rino-, korno-, adeno-, enterowirusów. *Bacillus*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Escherichia coli*, *Enterococcus*, *Enterobacter* i *Klebsiella* oraz posiada silne przeciwalergiczne i przeciwastmatyczne właściwości.

### WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwalergiczne i nawilżające. Specyfik obkurcza naczynia krwionośne w przewodach nosowych, likwiduje ból zatok, rozrzedza gęstą wydzielinę, oczyszcza z alergenów i nawilża śluzówkę nosa, zatok, zmniejsza obrzęk, łagodzi dolegliwości związane z katarrem pochodzenia alergicznego, skutecznie udrażnia nos i zatoki i ułatwia swobodne oddychanie.

### WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, przewlekły nieżyt, kichanie, niedrożność przewodów nosowych w przeziębieniu i grypie, zapalenie zatok przynosowych, ból głowy, ropne wycieki z nosa, katar sienny, alergiczne zapalenie oskrzeli, sezonowy i alergiczny nieżyt nosa. Okres wiosenny podczas wzmożonego występowania pyłków i alergenów w powietrzu, okres letni podczas pobytu w pomieszczeniach klimatyzowanych, okres jesienno-zimowy przy nadmiernie wysuszonym powietrzu w pomieszczeniach ogrzewanych.

### PRZECIWSKAZANIA

Indywidualna nietolerancja na komponenty preparatu, ciąża, okres laktacji. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia i dłużej niż 7 dni.

### SPOSÓB UŻYCIA

Stosować do każdego otworu nosowego:

Dzieciom 6-12 lat aplikować 1 dawkę sprayu 2 razy dziennie

Dorośli 2-4 dawki 2-3 razy dziennie.

Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

### PRZECHOWYWANIE

W ciemnym suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci w temperaturze pokojowej.

Najlepiej zastosować przed datą (miesiąc/rok) podaną na opakowaniu.

### OPAKOWANIE

20 ml sprayu w plastikowej butelce

Świadectwo rejestracji NQ/TPY11-2006,65016

Producent Shanxi Xueshanbaicao Pharmaceutical Co.LTD of China

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**